# BADAJOZ
## CIUDAD DE LAS AVES

Ayuntamiento de Badajoz
Concejalía de Turismo

# ¿Por qué venir a Badajoz a observar aves?

### ZONAS DE AVISTAMIENTOS DE AVES

1. Puente de la Autonomía, confluencia del Rivillas, Guadiana y canal de los Ayala.
2. Puente de Palmas: pasarela sobre el río.
3. Paseo Fluvial (mirador del Calamón y garcilla cangrejera).
4. Puente Real: nueva pasarela sobre el río.
5. Azud márgen izquierda (colonias de garzas).
6. Azud márgen derecha (vista de aves entrando al dormidero).

- **R** ..... Residente todo el año
- **E** ..... Estival, especie reproductora presente durante la primavera y el verano
- **I** ..... Especie invernante
- **P** ..... Especie presente durante los pasos migratorios
- ***** ..... Especie muy rara pero citada en ocasiones en el tramo donde nos encontramos




**(Puente de Palmas)**

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) R
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) E
Avetorillo común (Ixobrychus minutus) R
Martinete común (Nycticorax nycticorax) R
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) R
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) R
Garceta común (Egretta garzetta) R
Garceta grande (Egretta alba) I
Garza real (Ardea cinerea) R
Garza imperial (Ardea purpurea) E
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) E
Morito común (Plegadis falcinellus) R
Espátula común (Platalea leucorodia) R
Milano negro (Milvus migrans) E
Milano real (Milvus milvus) I
Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) R
Cernícalo primilla (Falco naumanni) V
Rascón europeo (Rallus aquaticus) R
Gallineta común (Gallinula chloropus) R
Calamón común (Porphyrio porphyrio) R
Chorlitejo chico (Charadrius dubius) R
Agachadiza común (Gallinago gallinago) I
Andarríos chico (Actitis hypoleucos) I
Andarríos grande (Tringa ochropus) I
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) R
Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) I *muy rara
Gaviota de Delaware (Larus delawarensis) I *muy rara
Gaviota cana (Larus canus) I *muy rara
Gaviota sombría (Larus fuscus) R
Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) I* muy rara
Gaviota enana (Hydrocoloeus minutus) I* muy rara
Charrancito común (Sternula albifrons) E
Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) E
Fumarel común (Chlidonias niger) E
Tórtola turca (Streptopelia decaocto) R
Vencejo común (Apus apus) E
Vencejo pálido (Apus pallidus) E
Vencejo real (Apus melba) E
Martín pescador común (Alcedo atthis) R
Golondrina común (Hirundo rustica) E
Golondrina dáurica (Cecropis daurica) E
Avión común (Delichon urbicum) E
Lavandera blanca (Motacilla alba) I
Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) I
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) E
Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica) I
Mirlo común (Turdus merula) R
Cetia ruiseñor (Cettia cetti) R
Zarcero bereber (Iduna opaca) E
Zarcero políglota (Hippolais polyglotta) E
Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) E
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) R
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) R
Papamoscas gris (Muscicapa striata) P
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) P
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) I
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) R
Carbonero común (Parus major) R
Pájaro-moscón europeo (Remiz pendulinus) R
Urraca común (Pica pica) R
Grajilla occidental (Corvus monedula) R
Estornino negro (Sturnus unicolor) R
Gorrión común (Passer domesticus) R

**(Puente de La Autonomía)**

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) R
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) E
Avetorillo común (Ixobrychus minutus) R
Martinete común (Nycticorax nycticorax) R
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) R
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) R
Garceta común (Egretta garzetta) R
Garceta grande (Egretta alba) I
Garza real (Ardea cinerea) R
Garza imperial (Ardea purpurea) E
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) E
Morito común (Plegadis falcinellus) R
Espátula común (Platalea leucorodia) R
Milano negro (Milvus migrans) E
Milano real (Milvus milvus) I
Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) R
Cernícalo primilla (Falco naumanni) V
Rascón europeo (Rallus aquaticus) R
Gallineta común (Gallinula chloropus) R
Calamón común (Porphyrio porphyrio) R
Chorlitejo chico (Charadrius dubius) R
Agachadiza común (Gallinago gallinago) I
Andarríos chico (Actitis hypoleucos) I
Andarríos grande (Tringa ochropus) I
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) R
Gaviota sombría (Larus fuscus) R
Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) E
Fumarel común (Chlidonias niger) E
Tórtola turca (Streptopelia decaocto) R
Vencejo común (Apus apus) E
Vencejo pálido (Apus pallidus) E
Vencejo real (Apus melba) E
Martín pescador común (Alcedo atthis) R
Golondrina común (Hirundo rustica) E
Avión común (Delichon urbicum) E
Lavandera blanca (Motacilla alba) I
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) E
Mirlo común (Turdus merula) R
Cetia ruiseñor (Cettia cetti) R
Zarcero bereber (Iduna opaca) E
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) R
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) R
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) I
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) R
Carbonero común (Parus major) R
Urraca común (Pica pica) R
Grajilla occidental (Corvus monedula) R
Estornino negro (Sturnus unicolor) R
Gorrión común (Passer domesticus) R

**(Paseo Fluvial)**

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) R
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) E
Avetorillo común (Ixobrychus minutus) R
Martinete común (Nycticorax nycticorax) R
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) R
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) R
Garceta común (Egretta garzetta) R
Garceta grande (Egretta alba) I
Garza real (Ardea cinerea) R
Garza imperial (Ardea purpurea) E
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) E
Morito común (Plegadis falcinellus) R
Espátula común (Platalea leucorodia) R
Milano negro (Milvus migrans) E
Milano real (Milvus milvus) I
Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) R
Cernícalo primilla (Falco naumanni) V
Rascón europeo (Rallus aquaticus) R
Gallineta común (Gallinula chloropus) R
Calamón común (Porphyrio porphyrio) R
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) R
Gaviota sombría (Larus fuscus) R
Charrancito común (Sternula albifrons) E
Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) E
Fumarel común (Chlidonias niger) E
Tórtola turca (Streptopelia decaocto) R
Vencejo común (Apus apus) E
Vencejo pálido (Apus pallidus) E
Vencejo real (Apus melba) E
Martín pescador común (Alcedo atthis) R
Golondrina común (Hirundo rustica) E
Avión común (Delichon urbicum) E
Lavandera blanca (Motacilla alba) I
Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) I
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) E
Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica) I
Mirlo común (Turdus merula) R
Cetia ruiseñor (Cettia cetti) R
Zarcero bereber (Iduna opaca) E
Zarcero políglota (Hippolais polyglotta) E
Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) E
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) R
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) R
Papamoscas gris (Muscicapa striata) P
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) P
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) I
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) P
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) R
Carbonero común (Parus major) R
Pájaro-moscón europeo (Remiz pendulinus) R
Agateador europeo (Certhia brachydactyla) R
Oropéndola europea (Oriolus oriolus) E
Alcaudón común (Lanius senator) E
Urraca común (Pica pica) R
Grajilla occidental (Corvus monedula) R
Estornino negro (Sturnus unicolor) R
Gorrión común (Passer domesticus) R
Estrilda común (Estrilda astrild) R
Bengalí rojo (Amandava amandava) R
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) R
Serín verdecillo (Serinus serinus) R
Verderón común (Chloris chloris) R
Jilguero europeo (Carduelis carduelis) R
Jilguero lúgano (Carduelis spinus) I raro

**(Puente Real)**

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) R
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) E
Avetorillo común (Ixobrychus minutus) R
Martinete común (Nycticorax nycticorax) R
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) R
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) R
Garceta común (Egretta garzetta) R
Garceta grande (Egretta alba) I
Garza real (Ardea cinerea) R
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) E
Morito común (Plegadis falcinellus) R
Milano negro (Milvus migrans) E
Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) R
Cernícalo primilla (Falco naumanni) V
Halcón peregrino (Falco peregrinus) I
Gallineta común (Gallinula chloropus) R
Calamón común (Porphyrio porphyrio) R
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) R
Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) E
Fumarel común (Chlidonias niger) E
Tórtola turca (Streptopelia decaocto) R
Vencejo común (Apus apus) E
Vencejo pálido (Apus pallidus) E
Vencejo real (Apus melba) E
Martín pescador común (Alcedo atthis) R
Golondrina común (Hirundo rustica) E
Avión común (Delichon urbicum) E
Lavandera blanca (Motacilla alba) I
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) E
Mirlo común (Turdus merula) R
Cetia ruiseñor (Cettia cetti) R
Zarcero bereber (Iduna opaca) E
Zarcero políglota (Hippolais polyglotta) E
Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) E
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) R
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) I
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) P
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) R
Carbonero común (Parus major) R
Pájaro-moscón europeo (Remiz pendulinus) R
Alcaudón común (Lanius senator) E
Urraca común (Pica pica) R
Grajilla occidental (Corvus monedula) R
Estornino negro (Sturnus unicolor) R
Gorrión común (Passer domesticus) R
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) R
Serín verdecillo (Serinus serinus) R
Verderón común (Chloris chloris) R
Jilguero europeo (Carduelis carduelis) R
Jilguero lúgano (Carduelis spinus) I raro

**(Ambos lados del Azud Del Guadiana)**

Silbón europeo (Anas penelope) I
Ánade friso (Anas strepera) I
Cerceta común (Anas crecca) I y P
Ánade azulón (Anas platyrhynchos) R
Ánade rabudo (Anas acuta) I
Cuchara común (Anas clypeata) I
Porrón europeo (Aythya ferina) I
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) E
Avetorillo común (Ixobrychus minutus) R
Martinete común (Nycticorax nycticorax) R
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) R
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) R
Garceta común (Egretta garzetta) R
Garceta grande (Egretta alba) I
Garza real (Ardea cinerea) R
Garza imperial (Ardea purpurea) E
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) E
Morito común (Plegadis falcinellus) R
Espátula común (Platalea leucorodia) R
Milano negro (Milvus migrans) E
Milano real (Milvus milvus) I
Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) R
Águila calzada (Aquila pennata) E
Águila pescadora (Pandion haliaetus) R
Rascón europeo (Rallus aquaticus) R
Gallineta común (Gallinula chloropus) R
Canastera común (Glareola pratincola) E
Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) R
Combatiente (Philomachus pugnax) P
Agachadiza común (Gallinago gallinago) I
Chorlitejo chico (Charadrius dubius) R
Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) P
Chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria) I
Avefría europea (Vanellus vanellus) R
Calamón común (Porphyrio porphyrio) R
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) R
Gaviota sombría (Larus fuscus) R
Charrancito común (Sternula albifrons) E
Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) E
Fumarel común (Chlidonias niger)E
Tórtola turca (Streptopelia decaocto)R
Vencejo común (Apus apus) E
Vencejo pálido (Apus pallidus) E
Vencejo real (Apus melba) E
Martín pescador común (Alcedo atthis) R
Abejaruco europeo (Merops apiaster) E
Abubilla (Upupa epops) R
Golondrina común (Hirundo rustica) E
Avión común (Delichon urbicum) E
Avión zapador (Riparia riparia) E
Lavandera blanca (Motacilla alba) I
Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) I
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) E
Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica) I
Mirlo común (Turdus merula) R
Cetia ruiseñor (Cettia cetti) R
Zarcero bereber (Iduna opaca) E
Zarcero políglota (Hippolais polyglotta) E
Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) E
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) R
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) R
Papamoscas gris (Muscicapa striata) P
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) P
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) I
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) P
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) R
Carbonero común (Parus major) R
Pájaro-moscón europeo (Remiz pendulinus) R
Agateador europeo (Certhia brachydactyla) R
Oropéndola europea (Oriolus oriolus) E
Alcaudón común (Lanius senator) E
Urraca común (Pica pica) R
Grajilla occidental (Corvus monedula) R
Estornino negro (Sturnus unicolor) R
Gorrión común (Passer domesticus) R
Estrilda común (Estrilda astrild) R
Bengalí rojo (Amandava amandava) R
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) R
Serín verdecillo (Serinus serinus) R
Verderón común (Chloris chloris) R
Jilguero europeo (Carduelis carduelis) R
Jilguero lúgano (Carduelis spinus) I* raro

Bienvenidos a Badajoz, una ciudad donde el conjunto de aves que puedes observar con facilidad es muy grande, ¡sólo tienes que proponértelo!

Encuentra la mejor época del año para venir, ellas (las aves), te están esperando.

Badajoz es la **única gran ciudad extremeña que cuenta con una ZEPA urbana** que la atraviesa por ello, todo son ventajas para ti.

Destaca no sólo por el gran número de especies, si no también, por las altas concentraciones que presenta. Por citar algunos ejemplos, apuntaremos que en el tramo comprendido entre el Puente de Palmas y el azud, han podido observarse todas las especies de **garzas ibéricas**, incluido el avetoro común, aunque destacan por su número las colonias reproductoras de **martinete común**, una especie que aquí además es invernante, en "armonía" con otras especies como **garcetas comunes** o **garcillas bueyeras**. Con suma facilidad podremos observar a la esquiva **garcilla cangrejera**, que suele permanecer inmóvil, posada en las islas de nenúfares o bien, junto a los **avetorillos** comunes en la espesura de los carrizos. Singularmente también aparece el **morito común**, que se trata del único ibis ibérico, cuya la población crece año tras año llegando en la actualidad casi al millar de individuos. También es fácil de detectar el **calamón común**, su azul intenso destacará en los reflejos del Guadiana y nos hará detener en él la mirada.

Aguas abajo del azud encontramos una importante colonia mixta de **abejarucos europeos** y **aviones zapadores**, que se mueven por todo el río en busca de los insectos que constituyen su dieta.

Sin embargo existen otras aves más discretas, que son las más buscadas por los ornitólogos expertos, como es el caso del **zarcero bereber**, que cuenta con una importante población en la zona, aunque deberemos de estar atentos a su canto para poder detectarlo, puesto que su plumaje es críptico entre la vegetación de ribera. Otra especie discreta es el **pájaro moscón**, cuyos nidos colgantes pueden observarse incluso desde los paseos urbanos. Durante la primavera y el verano los corros de tres especies de **vencejos** surcan las aguas bajo los ojos de los puentes: **vencejo pálido**, **común** y el maravilloso **vencejo real**, que cuenta con dos importantes colonias en el puente de Palmas y el Puente de la Autonomía.

Durante el invierno la balsa de agua del azud congrega gran cantidad de **cormoranes grandes**, **gaviotas reidoras y sombrías**, y diferentes especies de **patos**, pero sin duda la presencia de algunas rapaces como el **halcón peregrino**, que descansa en una de las grandes pilastras del Puente Real o el **águila pescadora** que frecuenta la zona desde la cola del embalse de Alqueva, donde se reproducen varias parejas que prefieren ascender por las aguas del Guadiana y hacer las delicias de los ornitólogos que frecuentan la zona. Si tenemos paciencia también será posible observar **aguiluchos laguneros y pálidos** que frecuentan un dormidero invernal cercano al río.

Ahora ya conoces algunas de las joyas ornitológicas de la ciudad, solo necesitas venir a observarlas.

*Juan Pablo Prieto Clemente*


Ayuntamiento de Badajoz
Concejalía de Turismo

BADAJOZ
CIUDAD DE LAS AVES


### Somormujo lavanco
*Podiceps cristatus*

**Descripción:** cuello esbelto, largo y fino, con pico largo y fino también. Cabeza coronada por una plumas oscuras a modo de "penachos", plumas castaño-rojizas a ambos lados de la cara. Cuando nada solo asoma un tercio del dorso y el cuello.

**Estatus:** residente común.

**Hábitat:** medios acuáticos tales como lagunas, embalses, ríos de corriente lenta...

### Avetorillo común
*Ixobrychus minutus*

**Descripción:** la más pequeña de las garzas ibéricas, el macho posee el píleo y el dorso negro, con grandes manchas alares claras: blanco-ocráceo. La hembra presenta un plumaje pardo listado que le camufla perfectamente en el eneal.

**Estatus:** reproductor común con numerosos invernantes en la zona.

**Hábitat:** vegetación acuática, eneales, carrizales...

### Martinete común
*Nycticorax nycticorax*

**Descripción:** garza de mediano tamaño de color gris con píleo y dorso negro con dos plumas occipitales blancas y largas. Destacan sus enormes ojos rojos adaptados a la visión crepuscular y nocturna.

**Estatus:** principalmente estival, aunque en la Zepa Azud de Badajoz se quedan numerosos ejemplares durante todo el invierno.

**Hábitat:** todo tipo de masas de agua, también corrientes, acostumbra a ocultarse en la vegetación de las orillas, aunque frecuenta pesqueras y posaderos en medio de ríos y embalses.

### Garcilla cangrejera
*Ardeola ralloides*

**Descripción:** garza pequeña de pico azulado con punta negra y plumaje ocráceo con plumas de la nuca alargadas y patentes. Cuello largo, aunque a menudo lo mantiene "recogido".

**Estatus:** residente en la zona.

**Hábitat:** aguas de corrientes lentas o estancadas, con abundante vegetación de orla.

### Cormorán grande
*Phalacrocorax carbo*

**Descripción:** ave grande, con el cuello largo y grueso, al igual que el pico. los adultos son muy oscuros, con iros verde y mancha amarillo anaranjada en la garganta, que se extiende sobre blanco. Carece de glándula uropigial, por lo que no puede impermeabilizar sus plumas y necesita secarlas al sol en posaderos de la orilla.

**Estatus:** principalmente invernante, aunque cada vez anidan más parejas en embalses del Guadiana.

**Hábitat:** totalmente ligado al medio acuático.

### Elanio azul
*Elanus caeruleus*

**Descripción:** rapaz pequeña, de tonos claros (blancos y grises), con "hombros" negros y ojos rojos, adaptados a la visión crepuscular.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** terrenos abiertos con árboles dispersos, dehesas, cultivos...

### Garza imperial
*Ardea purpurea*

**Descripción:** garza grande, de cuello muy largo y aspecto "reptilíneo", de color marrón rayado de negro con dorso y alas de color gris violáceo.

**Estatus:** reproductor estival.

**Hábitat:** eneales, carrizales, aguas de corriente lenta con abundante vegetación.

### Pájaro-moscón europeo
*Remiz pendulinus*

**Descripción:** más pequeño que un gorrión, cabeza gris con antifaz negro más extenso en machos. Dorso de color marrón rojizo y y partes inferiores ocráceas claras.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** frecuenta la vegetación ribereña, principalmente saucedas, eneales y carrizales.

### Calamón común
*Porphyrio porphyrio*

**Descripción:** gallineta de gran tamaño de color azul intenso con reflejos. Pico, escudete y patas de color rojo coral patente. Cola blanca, muy destacada.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** aguas quietas con abundante vegetación, tanto flotante como de orla.

### Milano negro
*Milvus migrans*

**Descripción:** rapaz de tamaño medio, de cuerpo oscuro, cabeza clara y punteada, alas y cola larga terminada en escotadura.

**Estatus:** reproductor estival, con escasos ejemplares invernantes en el vertedero cercano.

**Hábitat:** generalista, frecuenta cultivos, embalses, dehesas, pinares...

### Avefría europea
*Vanellus vanellus*

**Descripción:** del tamaño de una paloma doméstica, partes superiores muy oscuras con irisaciones verdosas y violáceas. Partes inferiores blancas limpias. Presenta una característica cresta o moño de plumas finas.

**Estatus:** principalmente invernante, aunque se reproducen algunas parejas en los arrozales cercanos.

**Hábitat:** cultivos, zonas abiertas, zonas inundables...

### Morito común
*Plegadis falcinellus*

**Descripción:** ave oscura de patas y cuello largo, con el pico también largo y curvado hacia abajo. Al incidir la luz se observan irisaciones en su plumaje de tonos verdosos y violáceos. En época de reproducción el tono se vuelve vinoso, rojizo con lista clara desde el ojo hacia el pico.

**Estatus:** aunque en el resto de España es reproductor estival, en esta zona permanece todo el año.

**Hábitat:** arrozales, lagunas con vegetación palustre, zonas de poca corriente...

### Cernícalo primilla
*Falco naumanni*

**Descripción:** pequeño halconcillo urbano, con dimorfismo sexual marcado. El macho presenta cabeza azulada y alas grises, hombros marrón teja sin motas, y partes inferiores de color crema moteado con pintas redondeadas. La hembra partes superiores marrón parduzco moteado, extremo de las alas oscuras y partes inferiores claras y moteadas.

**Estatus:** reproductor estival.

**Hábitat:** anida en hueco de edificios, frecuenta zonas agrarias despejadas y pastizales.

### Águila calzada
*Aquila pennata*

**Descripción:** la menor de las águilas ibéricas, presenta los tarsos emplumados "calzas", hasta los dedos. Esta especie cuenta con dos morphos: claro y oscuro. El claro presenta partes inferiores pálidas, blanquecinas con moteado pardo o gris y partes superiores oscuras. El morpho oscuro presenta las partes inferiores de color marrón oscuro y partes superiores oscuras también. Cola cuadrangular.

**Estatus:** principalmente reproductor estival, aunque en la zona suelen quedarse algunos ejemplares aislados durante el invierno.

**Hábitat:** dehesas, campos cultivados con retazos de vegetación original, márgenes de ríos, pinares...

### Águila pescadora
*Pandion haliaetus*

**Descripción:** águila de tamaño mediano grande, con partes inferiores muy claras que contrastan con las superiores oscuras. Cara blanca con "antifaz" oscura y píleo blanco. Franja pectoral difusa, oscura.

**Estatus:** principalmente invernal, aunque tras las reintroducciones por el método hacking en Portugal, se observan ejemplares durante todo el año.

**Hábitat:** frecuenta grandes masas de agua, embalses, charcas, ríos de gran caudal...

### Cigüeñuela común
*Himantopus himantopus*

**Descripción:** muy esbelta y elegante, de pico muy fino y patas larguísimas de color rosa oscuro intenso. Alas y hombros de color pizarra oscuro, mientras que las partes inferiores son de color blanco puro.

**Estatus:** residente, aunque durante el invierno se incrementa la población con ejemplares venidos del norte.

**Hábitat:** aguas tranquilas y poco profundas.

### Vencejo real
*Apus melba*

**Descripción:** el mayor de los vencejos ibéricos, de color marrón oscuro con vientre y garganta de color blanco puro. Alas largas y afiladas, y cola corta ahorquillada.

**Estatus:** reproductor estival.

**Hábitat:** cría en grietas o fisuras de edificios o cantiles rocosos, suele preferir la cercanía de masas de agua.

### Gallineta común
*Gallinula chloropus*

**Descripción:** algo mayor que una paloma, de tonos oscuros, cola corta y blanca, pico rojo con punta amarilla y escudete también rojo. Patas largas, con dedos también largos de color verde intenso.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** aguas quietas con abundante vegetación, tanto flotante como de orla.

### aguilucho lagunero occidental
*Circus aeruginosus*

**Descripción:** rapaz de tamaño medio, es el mayor de los aguiluchos ibéricos. Presenta un dimorfismo sexual marcado, siendo las hembras de color marrón oscuro con hombros, píleo, nica y garganta de color crema, mientras que el macho presenta cuerpo marrón, alas y cabeza gris y puntas negras.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** ligado a los medios acuáticos de aguas lentas o tranquilas, arrozales, lagunas...

### Gaviota sombría
*Larus fuscus*

**Descripción:** gaviota de gran tamaño. Los adultos presentan alas y dorso de color pizarra muy oscuro, y partes inferiores, cabeza y cuello claros. Pico amarillo con punto rojo en el extremo inferior.

**Estatus:** invernante.

**Hábitat:** zonas abiertas y cultivos próximos a grandes masas de agua. También frecuenta vertederos.

### Chorlitejo chico
*Charadrius dubius*

**Descripción:** limícola de pequeño tamaño, de pico corto y fino. Presenta anillo ocular amarillo intenso, más patente en época reproductora. Partes superiores marrón claro que contrastan con las inferiores blancas, banda pectoral y antifaz oscura.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** orillas limosas, lagunas pandas, arenales encharcadizos...

### Martín pescador común
*Alcedo atthis*

**Descripción:** de tamaño similar al gorrión, partes superiores de color azul más intenso en la espalda y obispillo, mientras que las inferiores son de un llamativo naranja, garganta y laterales del cuello blanco níveo. Pico largo y robusto, cola muy corta.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** muy ligado al medio acuático en todas sus vertientes.

### Serín verdecillo
*Serinus serinus*

**Descripción:** algo menor que un canario, de color verdoso amarillento listado. Pico muy corto, cola ahorquillada. El macho es más amarillento en el periodo reproductor, mientras que la hembra presenta tonos verdosos más discretos.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** generalista, puede observarse enjardines, setos, cultivos, zonas abiertas, dehesas, bosques de coníferas.

### Andarríos chico
*Actitis hypoleucos*

**Descripción:** limícola de pequeño tamaño, de partes superiores marrón moteado más oscuro, lista ocular y banda pectoral, sin embargo las partes inferiores son blanco limpio. Patas amarillo-verdosas, y patente banda alar en vuelo.

**Estatus:** invernante.

**Hábitat:** orillas limosas de aguas someras, canales de riego, azudes, corrientes lentas o medias...

Ayuntamiento de Badajoz
Concejalía de Turismo